

INSTRUÇÕES DE USO

ADAPTIS GEL

Gel oftálmico estéril

Ação:

Lubrificante ocular externo em casos de secreção lacrimal insuficiente ou lesão córnea. Carbopol 940 0,2% é um gel líquido claro e transparente com uma viscosidade elevada e um período prolongado de retenção ocular (8 vezes superior ao álcool de polivinil 1,4%).

Indicações:

- Casos inflamatórios oculares externos devido à secreção lacrimal insuficiente ou secreção excessiva, exposição ao vento, sol ou substâncias irritantes.
- Síndrome do olho seco.
- Queratoconjuntivite seca.
- Queratoconjuntivite crônica.
- Afecções conjuntivas causadas por fatores térmicos, químicos ou radiação.
- Ceratite lagoftálmica.
- Ceratite neuroparalítica.
- Ressecamento córneo pós-menopausa ou pseudo-senil.
- Piscada pouco frequente (por exemplo, durante a anestesia, coma, leitura, trabalho em frente a telas, etc.).
- Síndrome de Sjögren.
- Blefaroplastia pós-cosmética da queratoconjuntivite seca.

ADAPTIS GEL serve apenas para uso externo nos olhos. Ele não deve ser injetado intraocularmente.

Composição:

Cada 1 g de gel oftálmico contém:

Ácido Poliacrílico (Carbopol 940) 2,0 mg

Cetrimida 0,1 mg; Sorbitol 55,0 mg; Edetato dissódico diidratado 0,1 mg; Hidróxido de sódio q.s. pH 7; Água purificada q.s.

Instruções de uso:

A frequência de aplicação será decidida de acordo com a necessidade de cada paciente.

Uma ou duas gotas, três ou quatro vezes ao dia é a dosagem recomendada. Em alguns casos, o produto pode ser aplicado com mais frequência.

As gotas devem ser instiladas no saco conjuntivo.

Durante a aplicação, o tubo deve estar na posição vertical. Ao apertar o tubo, uma gota aparece e é facilmente deslocada da ponta.

Contra-indicações:

Hipersensibilidade conhecida a qualquer dos componentes da fórmula.



Não aplique o produto utilizando lentes de contato.
O produto não deve ser utilizado de forma intra-ocular.

Advertências:

Não injete. Não engula.

Em caso de dor no(s) olho(s) tratado(s), irritação ou alterações na visão, ou caso a condição piore ou dure mais de 72 horas, o uso deve ser suspenso e um profissional médico deve ser consultado.

O uso inapropriado de ADAPTIS GEL como uma substância viscoelástica intraocular pode produzir uma lesão irreparável na visão.

Precauções:

Para evitar a contaminação do conteúdo do tubo, não coloque a ponta em contato com qualquer outra superfície. Feche o tubo imediatamente após o uso.

Use o produto apenas caso o frasco esteja intacto.

Não coloque a ponta do tubo em contato com os olhos. Quando o produto for aberto, ele não deve ser utilizado durante um período superior a um mês.

Quando tiver passado esse período, o produto deve ser descartado.

Reações Adversas:

Geralmente, o gel oftálmico ADAPTIS GEL é bem tolerado pelos pacientes.

Em pacientes sensíveis, queimação, vermelhidão e dor ocular foram raramente observadas, e esses efeitos geralmente desapareciam rapidamente.

Episódios de visão turva após a administração do produto são os efeitos adversos mais comuns, e parecem estar relacionados à ação prolongada e viscosidade do gel. Eles não requerem nenhum tratamento, são leves e temporários em todos os casos e não representam um motivo para suspender o tratamento.

Nenhum efeito sistêmico foi apresentado com o uso do gel oftálmico ADAPTIS GEL®.

Informações ao paciente:

Para evitar a contaminação do conteúdo do tubo, não coloque a ponta em contato com qualquer outra superfície. O manuseio incorreto pode contaminá-la, produzindo infecções oculares.

O uso de produtos contaminados pode causar uma lesão ocular grave, resultando em diminuição da visão.

Feche o tubo imediatamente após o uso.

Use o produto apenas caso o frasco esteja intacto.

Quando o produto for aberto, ele não deve ser utilizado durante um período superior a um mês.

Quando tiver passado esse período, o produto deve ser descartado.

Não utilize o produto após a data de validade mencionada.

**Como é fornecido**

Tubo contendo 5g e 10g de gel oftálmico estéril.

Estéril – Esterilizado por Filtração - DESCARTE O PRODUTO APÓS UM MÊS DE SUA ABERTURA.

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

Condições de armazenagem:

Manter à temperatura ambiente (15 a 30°C).

Proteger da luz e manter em lugar seco.

Fabricado por:

Laboratórios Poen S.A.C.I.F.I.

Bermúdez 1004 – C1407BDR

Buenos Aires, Argentina - INDÚSTRIA ARGENTINA

Registrado por:

Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda

Rua Santa Rita D'Oeste, 282 – Vila do Encontro - CEP: 04323-060 - São Paulo/SP

CNPJ: 96.382.429/0001-60 –

Farm. Resp: Katia Massae Kinoshita – CRF/SP no. 15.263

Registro ANVISA nº 80192010034

Importado e Comercializado por:

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda - CNPJ: 05.044.984/0001-26

Serviço de atendimento ao consumidor
0800 - 500600 - Discagem direta Gratuita
sac@legrandpharma.com.br - www.legrandpharma.com.br

No. de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho
