

I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

ALKAGEL®

hidróxido de magnésio + hidróxido de alumínio

APRESENTAÇÃO:

Suspensão de 40 mg/mL + 435,730 mg/mL. Embalagem contendo 1 frasco de 240 mL sabor morango.

Suspensão de 40 mg/mL + 435,730 mg/mL. Embalagem contendo 1 frasco de 240 mL sabor hortelã.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada mL da suspensão sabor morango contém:

hidróxido de magnésio..... 40 mg

hidróxido de alumínio 435,730 mg

veículo* q.s.p..... 1 mL

*metilparabeno, propilparabeno, essência de morango, vermelho allura 129, sacarina sódica, digliconato de clorexidina, propilenoglicol, simeticona, sorbitol, água purificada.

COMPOSIÇÃO

Cada mL da suspensão sabor hortelã contém:

hidróxido de magnésio..... 40 mg

hidróxido de alumínio 435,730 mg

veículo* q.s.p..... 1 mL

* metilparabeno, propilparabeno, essência de menta, sacarina sódica, digliconato de clorexidina, propilenoglicol, simeticona, sorbitol, água purificada.

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÃO

ALKAGEL® é indicado como antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

MODO DE USAR

Tomar de 5 a 10 mL, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

ADVERTÊNCIA

Agitar antes de usar.

Contraindicações: não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, insuficiência renal severa, com hipofosfatemia (pouco fósforo no sangue) ou obstrução intestinal. Não deve ser utilizado na gravidez e na amamentação.

Precauções: administrar com cautela em pacientes com porfiria que estejam fazendo hemodiálise; na vigência de dietas pobres em fósforo.

Não se deve ultrapassar a dose diária ou prolongar o tratamento por mais de 14 dias (com dose máxima).

Esse medicamento pode reduzir a absorção de outros medicamentos. Por esse motivo, deve ser administrado 2 horas antes ou depois do uso de outros medicamentos.

O uso prolongado de antiácidos contendo alumínio por pacientes normofosfatêmicos pode resultar em hipofosfatemia.

Em pacientes com insuficiência renal, a administração desse medicamento deve ser realizada sob supervisão médica.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

ALKAGEL® sabor morango - Atenção: Contém o corante vermelho allura 129 que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.

ALKAGEL® sabor morango e hortelã - Atenção: Contém sorbitol.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto do medicamento: sabor morango: suspensão homogênea, na cor rosa, com sabor e odor de morango.

Sabor hortelã: suspensão homogênea, na cor branca, com sabor e odor de menta.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

III) DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO NOTIFICADO

Notificado e produzido por: **EMS S/A.**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08

Bairro Chácara Assay

CEP 13.186-901 – Hortolândia/SP

CNPJ 57.507.378/0003-65

Indústria Brasileira

SAC 0800-019 19 14

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.



folheto-alkagel-MN003-EMS_v0