

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA

Geolab Indústria Farmacêutica S/A
Cápsula dura de liberação prolongada
37,5mg, 75mg e 150mg

MODELO DE BULA PARA O PACIENTE

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

cloridrato de venlafaxina

Medicamento genérico, Lei n° 9.787 de 1999.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Cápsula dura de liberação prolongada de 37,5mg, 75mg ou 150mg: Embalagem contendo 30 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de cloridrato de venlafaxina 37,5 mg contém:

cloridrato de venlafaxina* 42,38 mg

excipientes** q.s.p.1 cápsula

* equivalente a 37,5 mg de venlafaxina base.

**Excipientes: sacarose, amido, talco, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de titânio, gelatina e corante D&C amarelo 10.

Cada cápsula de cloridrato de venlafaxina 75 mg contém:

cloridrato de venlafaxina*84,75 mg

excipiente** q.s.p.1 cápsula

* equivalente a 75 mg de venlafaxina base.

**Excipientes: sacarose, amido, talco, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de titânio e gelatina.

Cada cápsula de cloridrato de venlafaxina 150 mg contém:

cloridrato de venlafaxina*169,50 mg

excipiente** q.s.p.1 cápsula

* equivalente a 150 mg de venlafaxina base.

**Excipientes: sacarose, amido, talco, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de titânio, gelatina e corante FDA/E172 óxido de ferro amarelo.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O **cloridrato de venlafaxina** está indicado para o tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada e; para prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também está indicado para o tratamento, incluindo tratamento em longo prazo, do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de ansiedade social (também conhecido como fobia social) e do transtorno do pânico.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A venlafaxina (substância presente no **cloridrato de venlafaxina**) e a O-desmetilvenlafaxina (metabólito ativo da venlafaxina), são inibidores da recaptção neuronal de serotonina, norepinefrina e dopamina, ou seja, o **cloridrato de venlafaxina** aumenta a quantidade de determinadas substâncias (serotonina, norepinefrina e dopamina) no sistema nervoso levando à melhora sintomática dentro das indicações presentes nessa bula (vide item 1. Para que este medicamento foi indicado?). Tempo estimado para início da ação terapêutica do medicamento é de 3 a 4 dias.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a qualquer componente da formulação nem por pacientes recebendo antidepressivos da classe dos inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), como por exemplo tranilcipromina, selegilina, rasagilina e linezolida.

O tratamento com o **cloridrato de venlafaxina** não deve ser iniciado no período de, no mínimo, 14 dias após a descontinuação do tratamento com um inibidor da monoaminoxidase (IMAO). O **cloridrato de venlafaxina** deve ser descontinuado por, no mínimo, 7 dias antes do início do tratamento com qualquer inibidor da monoaminoxidase.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para uso em menores de 18 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Recomenda-se que o uso do **cloridrato de venlafaxina** não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida progressivamente de acordo com as instruções do seu médico.

As cápsulas do **cloridrato de venlafaxina** contêm pequenos grânulos que liberam o medicamento lentamente no intestino. A parte destes grânulos que não é absorvida pelo organismo é eliminada e pode ser vista nas fezes.

Pacientes tratados devem ser apropriadamente monitorados e atentamente observados quanto à piora clínica e risco de suicídio. Pacientes, familiares e cuidadores devem ficar alerta e informar ao médico sobre aparecimento de ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, hostilidade, agressividade, impulsividade, outras alterações incomuns de comportamento, piora da depressão e ideação suicida, principalmente no início do tratamento ou durante qualquer alteração de dose.

Houve relatos de disfunção sexual de longa duração, em que os sintomas continuaram, apesar da descontinuação dos inibidores de recaptção da serotonina-noradrenalina.

Os pacientes devem ser aconselhados a não consumir álcool, considerando seus efeitos no sistema nervoso central (SNC) e potencial de causar piora clínica de quadros psiquiátricos e potencial de interagir adversamente com venlafaxina, incluindo efeitos depressores sobre o SNC.

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de insuficiência renal (prejuízo na função dos rins) ou hepática (prejuízo na função do fígado). Siga rigorosamente a orientação do seu médico.

Foi observada elevação da pressão arterial em alguns pacientes usando altas doses de **cloridrato de venlafaxina** e, por este motivo, deve-se fazer monitoramento regular da pressão arterial e acompanhamento médico.

Pode ocorrer midríase (dilatação da pupila) associada ao tratamento com o cloridrato de venlafaxina. Recomenda-se acompanhamento rigoroso dos pacientes com pressão intraocular (do olho) elevada ou com risco de glaucoma (aumento rápido, abrupto, da pressão ocular).

Gravidez: a segurança do uso de **cloridrato de venlafaxina** durante a gravidez em humanos ainda não foi estabelecida. O **cloridrato de venlafaxina** só deve ser administrado a mulheres grávidas se os benefícios esperados superarem os riscos possíveis. Se o **cloridrato de venlafaxina** for usado durante a gravidez, o recém-nascido deve ser monitorado pelo médico pelo risco de apresentar complicações.

Um estudo mostrou que as mulheres que interromperam a medicação antidepressiva durante a gravidez tinham maior probabilidade de apresentar uma recidiva da depressão maior do que as mulheres que continuaram a medicação antidepressiva.

A exposição a antidepressivos da classe dos inibidores de receptação de serotonina e noradrenalina (SNRIs), como é o caso do **cloridrato de venlafaxina**, da metade ao final da gravidez pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, e a exposição a SNRIs perto do parto pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: Se você está amamentando ou pretende amamentar, não é recomendado usar o **cloridrato de venlafaxina**, já que ele é excretado pelo leite e a segurança deste medicamento para as mulheres e crianças não é conhecida.

Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

Uso em Idosos: não há recomendação específica para ajuste de dose do **cloridrato de venlafaxina** de acordo com a idade do paciente.

Efeitos sobre as atividades que requerem concentração: o **cloridrato de venlafaxina** pode prejudicar o julgamento, o raciocínio ou as habilidades motoras. Até que você saiba como o **cloridrato de venlafaxina** te afeta, tenha cuidado ao realizar atividades que requeiram concentração, tais como dirigir ou operar máquinas.

Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento com cloridrato de venlafaxina, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.

O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.

Abuso e dependência: Estudos clínicos não evidenciaram comportamento de busca por drogas, desenvolvimento de tolerância, ou elevação indevida de dose da venlafaxina durante o período de uso.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Atenção: Contém sacarose (tipo de açúcar).

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.

Interações medicamentosas: Sempre avise ao seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa.

O uso concomitante (no mesmo período de tempo) de **cloridrato de venlafaxina** com medicamentos que aumentam a predisposição ao sangramento pode aumentar o risco de sangramentos espontâneos. O uso de **cloridrato de venlafaxina** com outros medicamentos que podem aumentar a quantidade de serotonina no organismo (outros antidepressivos, antipsicóticos, anfetaminas e antagonistas da dopamina) pode aumentar o risco de aparecimento da

síndrome serotoninérgica (reação do corpo ao excesso de serotonina que se manifesta por inquietação, alteração do comportamento, rigidez muscular, aumento da temperatura, aumento da velocidade dos reflexos e tremores; que pode ser fatal), o uso com cetoconazol (antifúngico) pode aumentar a quantidade de **cloridrato de venlafaxina** no sangue. O uso de **cloridrato de venlafaxina** com antidepressivos do tipo IMAO pode levar a reações sérias, com possíveis alterações rápidas dos sinais vitais e do estado mental (vide item 3. Quando não devo usar este medicamento?). O **cloridrato de venlafaxina** pode interferir nos resultados dos testes de urina para avaliar a presença de substâncias como fenciclidina e anfetaminas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser armazenado em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), protegido da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas:

O **cloridrato de venlafaxina** apresenta-se na forma de cápsula de gelatina contendo pellets de coloração branca a levemente amarelada.

As cápsulas contendo 37,5mg apresentam-se na coloração amarelo opaco e branco opaco.

As cápsulas contendo 75mg apresentam-se na coloração branca.

As cápsulas contendo 150mg apresentam-se na coloração amarelo marfim opaco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser administrado com alimentos, aproximadamente no mesmo horário todos os dias.

As cápsulas devem ser tomadas inteiras com algum líquido e não devem ser divididas, trituradas, mastigadas ou dissolvidas, ou podem ser administradas cuidadosamente abrindo-se a cápsula e espalhando todo o conteúdo em uma colher de purê de maçã. Esta mistura de medicamento e alimento deve ser engolida imediatamente sem mastigar e deve ser seguida de um copo de água para assegurar que você engoliu todo o medicamento.

Depressão Maior

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Transtorno de Ansiedade Generalizada

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Fobia Social

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Não há evidências de que doses maiores proporcionem algum benefício adicional.

Transtorno do Pânico

Recomenda-se que a dose de 37,5mg/dia de **cloridrato de venlafaxina** seja usada por 7 dias. Depois, a dose deve ser aumentada para 75mg/dia. Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Descontinuando o uso de cloridrato de venlafaxina

Recomenda-se que **cloridrato de venlafaxina** não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida gradualmente de acordo com as instruções do seu médico. O período necessário para descontinuação gradativa pode depender da dose, da duração do tratamento e de cada paciente individualmente.

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em 25% a 50% nos pacientes com insuficiência renal com taxa de filtração glomerular (TFG) de 10 a 70mL/min.

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em até 50% nos pacientes em hemodiálise.

Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em até 50% em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. Em alguns pacientes, reduções maiores que 50% podem ser adequadas.

Uso em Crianças

Não há experiência suficiente com o uso de **cloridrato de venlafaxina** em pacientes com menos de 18 anos de idade.

Uso em Idosos

Não há recomendação específica para ajuste da dose do **cloridrato de venlafaxina** de acordo com a idade do paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar **cloridrato de venlafaxina** no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento 2 vezes para compensar doses esquecidas. Se você esquecer uma dose você pode comprometer o resultado do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas estão relacionadas abaixo de acordo com as categorias de frequência:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): insônia, dor de cabeça, tontura, sedação, náusea, boca seca, constipação, hiperidrose (suor excessivo).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): diminuição do apetite, sonhos anormais, nervosismo, diminuição da libido, agitação, anorgasmia (falta de prazer sexual ou orgasmo), acatisia (incapacidade de se manter quieto), tremor, parestesia (dormência e formigamento), disgeusia (alteração do paladar), deficiência visual, distúrbio de acomodação, midríase (pupila dilatada), tinido (zumbido no ouvido), taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos), palpitação, hipertensão (pressão alta), ondas de calor, dispneia (falta de ar),

bocejos, diarreia, vômito, erupção cutânea (lesão na pele), prurido (coceira), suor noturno, hipertonia (aumento da contração muscular), hesitação urinária, retenção urinária, polaciúria (aumento da frequência urinária), disfunção erétil, ejaculação anormal, fadiga, astenia (fraqueza), calafrios, perda de peso, aumento de peso.

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): estado de confusão, mania, hipomania, despersonalização, alucinação, orgasmo anormal, bruxismo, apatia (ausência de emoção), síncope (desmaio), mioclonia (espasmos musculares), distúrbio do equilíbrio, coordenação anormal, discinesia (movimentos involuntários, principalmente dos músculos da boca, língua e face, ocorrendo exteriorização da língua e movimentos de um canto a outro da boca), hipotensão ortostática (diminuição da pressão arterial ao levantar), hipotensão (pressão baixa), sangramento gastrointestinal, teste de função hepática anormal, urticária (alergia de pele), alopecia (perda de cabelo), equimose (manchas arroxeadas), reação de fotossensibilidade (sensibilidade à luz), incontinência urinária (dificuldade em controlar a urina), metrorragia (sangramento vaginal fora do período menstrual), menorragia (sangramento menstrual excessivo ou prolongado), aumento do colesterol no sangue, fratura óssea.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): agranulocitose (ausência de células de defesa: neutrófilos, basófilos e eosinófilos), anemia aplástica (diminuição da produção de glóbulos vermelhos do sangue), pancitopenia (diminuição de todas as células do sangue), neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), reação anafilática, secreção inapropriada do hormônio antidiurético (alteração na secreção do hormônio ADH), hiponatremia (redução da concentração de sódio no sangue), delírio, síndrome neuroléptica maligna (contração muscular grave, febre, aceleração dos batimentos do coração, tremor), síndrome da serotonina (alterações do estado mental, dos movimentos entre outras), convulsão, distonia (contração involuntária da musculatura, lenta e repetitiva), glaucoma de ângulo fechado, *torsade de pointes*, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, eletrocardiograma com prolongamento do intervalo QT, cardiomiopatia do estresse (cardiomiopatia de takotsubo), doença pulmonar intersticial, eosinofilia pulmonar, pancreatite (inflamação no pâncreas), hepatite (inflamação do fígado), Síndrome de Stevens-Johnson (reação alérgica grave), necrólise epidérmica tóxica (descamação grave da camada superior da pele), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, geralmente de origem alérgica), eritema multiforme (manchas vermelhas, bolhas e ulcerações em todo o corpo), rabdomiólise (destruição das células musculares).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): trombocitopenia (diminuição das plaquetas do sangue), prolactina aumentada no sangue, discinesia tardia, hemorragia da mucosa, tempo de sangramento aumentado.

Os seguintes sintomas foram relatados em associação com a repentina interrupção ou redução de dose ou retirada de tratamento: hipomania, ansiedade, agitação, nervosismo, confusão, insônia ou outros distúrbios do sono, fadiga (sensação de cansaço), sonolência, parestesia (formigamento), tontura, convulsão, vertigem, cefaleia (dor de cabeça), sintomas de gripe, tinido, coordenação e equilíbrio prejudicados, tremor, sudorese, boca seca, anorexia, diarreia, náusea e vômito, deficiência visual e hipertensão. Em estudos anteriores à comercialização, a maioria das reações à interrupção foi leve e resolvida sem tratamento. Embora esses eventos sejam geralmente autolimitados, tem havido relatos de sintomas graves de descontinuação e, às vezes, esses efeitos podem ser prolongados e graves.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Recomendam-se medidas gerais de suporte e tratamento sintomático, além de monitorização do ritmo cardíaco e dos sinais vitais. Não se recomenda a indução de vômitos quando houver risco de aspiração. Pode haver indicação para lavagem gástrica caso essa lavagem seja realizada logo após a ingestão ou em pacientes sintomáticos. A administração de carvão ativado também pode limitar a absorção do fármaco. É provável que diurese forçada, diálise, hemoperfusão e ex-sanguíneo transfusão não apresentem benefícios. Não são conhecidos antídotos específicos do **cloridrato de venlafaxina**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DA RECEITA

DIZERES LEGAIS

Registro 1.5423.0250

Registrado e produzido por:

Geolab Indústria Farmacêutica S/A

CNPJ: 03.485.572/0001-04

VP. 1B QD.08-B MÓDULOS 01 A 08 - DAIA - ANÁPOLIS – GO

www.geolab.com.br

Indústria Brasileira

SAC: 0800 701 6080

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 08/08/2024.



Histórico de Alteração para a Bula

Anexo B

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/Notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Número expediente	Assunto	Data do expediente	Número expediente	Assunto	Data da Aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
28/05/2018	0426816/18-4	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	28/05/2018	0426816/18-4	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	28/05/2018	Versão Inicial Dizeres Legais	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
01/07/2019	0576918/19-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	01/07/2019	0576918/19-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	01/07/2019	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento?	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30

06/08/2019	1935983/19-7	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/08/2019	1935983/19-7	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/08/2019	Inclusão da concentração de 37,5mg	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
06/11/2019	3049707/19-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2019	3049707/19-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2019	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode causar?	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
08/09/2020	3043938/20-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/09/2020	3043938/20-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/09/2020	6. Como devo usar este medicamento?	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30

12/07/2023	0719299/23-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/07/2023	0719299/23-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/07/2023	Forma farmacêutica 3. Quando não devo usar este medicamento? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
04/08/2023	0818555/23-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	04/08/2023	0818555/23-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	04/08/2023	Correção ortográfica	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
06/11/2024	1531404/24-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2024	1531404/24-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2024	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Dizeres legais	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
10/12/2024	1688052/24-1__	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/12/2024	1688052/24-1	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/12/2024	Correção do texto de bula	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30

08/01/2025	0022275/25-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	0022275/25-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	Dizeres Legais	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
08/01/2025	0024738/25-5	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	0024738/25-5	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Dizeres legais	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
08/01/2025	---	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	---	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	Correção do texto de bula	VP	37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA

Geolab Indústria Farmacêutica S/A
Cápsula dura de liberação prolongada
75mg e 150mg

MODELO DE BULA PARA O PACIENTE

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

cloridrato de venlafaxina

Medicamento genérico, Lei n° 9.787 de 1999.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Cápsula dura de liberação prolongada de 75mg ou 150mg: Embalagem contendo 300 cápsulas*.

*Embalagem Governamental

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de cloridrato de venlafaxina 75 mg contém:

cloridrato de venlafaxina*84,75 mg

excipiente** q.s.p.1 cápsula

* equivalente a 75 mg de venlafaxina base.

**Excipientes: sacarose, amido, talco, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de titânio e gelatina.

Cada cápsula de cloridrato de venlafaxina 150 mg contém:

cloridrato de venlafaxina*169,50 mg

excipiente** q.s.p.1 cápsula

* equivalente a 150 mg de venlafaxina base.

**Excipientes: sacarose, amido, talco, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de titânio, gelatina e corante FDA/E172 óxido de ferro amarelo.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O **cloridrato de venlafaxina** está indicado para o tratamento da depressão, incluindo depressão com ansiedade associada e; para prevenção de recaída e recorrência da depressão. Também está indicado para o tratamento, incluindo tratamento em longo prazo, do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de ansiedade social (também conhecido como fobia social) e do transtorno do pânico.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A venlafaxina (substância presente no **cloridrato de venlafaxina**) e a O-desmetilvenlafaxina (metabólito ativo da venlafaxina), são inibidores da recaptação neuronal de serotonina, norepinefrina e dopamina, ou seja, o **cloridrato de venlafaxina** aumenta a quantidade de determinadas substâncias (serotonina, norepinefrina e dopamina) no sistema

nervoso levando à melhora sintomática dentro das indicações presentes nessa bula (vide item 1. Para que este medicamento foi indicado?). Tempo estimado para início da ação terapêutica do medicamento é de 3 a 4 dias.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a qualquer componente da formulação e, por pacientes recebendo antidepressivos da classe dos inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), como por exemplo tranilcipromina, selegilina, rasagilina e linezolida.

O tratamento com o **cloridrato de venlafaxina** não deve ser iniciado no período de, no mínimo, 14 dias após a descontinuação do tratamento com um inibidor da monoaminoxidase (IMAO). O **cloridrato de venlafaxina** deve ser descontinuado por, no mínimo, 7 dias antes do início do tratamento com qualquer inibidor da monoaminoxidase.

Este medicamento é contraindicado para uso em menores de 18 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Recomenda-se que o uso do **cloridrato de venlafaxina** não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida progressivamente de acordo com as instruções do seu médico.

As cápsulas do **cloridrato de venlafaxina** contêm pequenos grânulos que liberam o medicamento lentamente no intestino. A parte destes grânulos que não é absorvida pelo organismo é eliminada e pode ser vista nas fezes.

Pacientes tratados devem ser apropriadamente monitorados e atentamente observados quanto à piora clínica e risco de suicídio. Pacientes, familiares e cuidadores devem ficar alerta e informar ao médico sobre aparecimento de ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, hostilidade, agressividade, impulsividade, outras alterações incomuns de comportamento, piora da depressão e ideação suicida, principalmente no início do tratamento ou durante qualquer alteração de dose.

Houve relatos de disfunção sexual de longa duração, em que os sintomas continuaram, apesar da descontinuação dos inibidores de recaptção da serotonina-noradrenalina.

Os pacientes devem ser aconselhados a não consumir álcool, considerando seus efeitos no sistema nervoso central (SNC) e potencial de causar piora clínica de quadros psiquiátricos e potencial de interagir adversamente com venlafaxina, incluindo efeitos depressores sobre o SNC.

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de insuficiência renal (prejuízo na função dos rins) ou hepática (prejuízo na função do fígado). Siga rigorosamente a orientação do seu médico.

Foi observada elevação da pressão arterial em alguns pacientes usando altas doses de cloridrato de venlafaxina e, por este motivo, deve-se fazer monitoramento regular da pressão arterial e acompanhamento médico.

Pode ocorrer midríase (dilatação da pupila) associada ao tratamento com o cloridrato de venlafaxina. Recomenda-se acompanhamento rigoroso dos pacientes com pressão intraocular (do olho) elevada ou com risco de glaucoma (aumento rápido, abrupto, da pressão ocular).

Gravidez: a segurança do uso de **cloridrato de venlafaxina** durante a gravidez em humanos ainda não foi estabelecida.

O **cloridrato de venlafaxina** só deve ser administrado a mulheres grávidas se os benefícios esperados superarem os riscos possíveis. Se o **cloridrato de venlafaxina** for usado durante a gravidez, o recém-nascido deve ser monitorado pelo médico pelo risco de apresentar complicações.

Um estudo mostrou que as mulheres que interromperam a medicação antidepressiva durante a gravidez tinham maior probabilidade de apresentar uma recidiva da depressão maior do que as mulheres que continuaram a medicação antidepressiva.

A exposição a antidepressivos da classe dos inibidores de receptação de serotonina e noradrenalina (SNRIs), como é o caso do **cloridrato de venlafaxina**, da metade ao final da gravidez pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, e a exposição a SNRIs perto do parto pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: Se você está amamentando ou pretende amamentar, não é recomendado usar o **cloridrato de venlafaxina**, já que ele é excretado pelo leite e a segurança deste medicamento para as mulheres e crianças não é conhecida.

Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

Uso em Idosos: não há recomendação específica para ajuste de dose do **cloridrato de venlafaxina** de acordo com a idade do paciente.

Efeitos sobre as atividades que requerem concentração: o **cloridrato de venlafaxina** pode prejudicar o julgamento, o raciocínio ou as habilidades motoras. Até que você saiba como o **cloridrato de venlafaxina** te afeta, tenha cuidado ao realizar atividades que requeiram concentração, tais como dirigir ou operar máquinas.

Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento com cloridrato de venlafaxina, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.

O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.

Abuso e dependência: Estudos clínicos não evidenciaram comportamento de busca por drogas, desenvolvimento de tolerância, ou elevação indevida de dose da venlafaxina durante o período de uso.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Atenção: Contém sacarose (tipo de açúcar).

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.

Interações medicamentosas: Sempre avise ao seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa.

O uso concomitante (no mesmo período de tempo) de **cloridrato de venlafaxina** com medicamentos que aumentam a predisposição ao sangramento pode aumentar o risco de sangramentos espontâneos. O uso de **cloridrato de venlafaxina** com outros medicamentos que podem aumentar a quantidade de serotonina no organismo (outros antidepressivos, antipsicóticos, anfetaminas e antagonistas da dopamina) pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica (reação do corpo ao excesso de serotonina que se manifesta por inquietação, alteração do comportamento, rigidez muscular, aumento da temperatura, aumento da velocidade dos reflexos e tremores; que pode ser fatal), o uso com cetoconazol (antifúngico) pode aumentar a quantidade de **cloridrato de venlafaxina** no sangue. O uso de **cloridrato de venlafaxina** com antidepressivos do tipo IMAO pode levar a reações sérias, com possíveis alterações rápidas dos sinais vitais e do estado mental (vide item 3. Quando não devo usar este medicamento?). O **cloridrato de venlafaxina** pode interferir nos resultados dos testes de urina para avaliar a presença de substâncias como fenciclidina e anfetaminas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser armazenado em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), protegido da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas:

O **cloridrato de venlafaxina** apresenta-se na forma de cápsula de gelatina contendo pellets de coloração branca a levemente amarelada.

As cápsulas contendo 75mg apresentam-se na coloração branca.

As cápsulas contendo 150mg apresentam-se na coloração amarelo marfim opaco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de venlafaxina** deve ser administrado com alimentos, aproximadamente no mesmo horário todos os dias.

As cápsulas devem ser tomadas inteiras com algum líquido e não devem ser divididas, trituradas, mastigadas ou dissolvidas, ou podem ser administradas cuidadosamente abrindo-se a cápsula e espalhando todo o conteúdo em uma colher de purê de maçã. Esta mistura de medicamento e alimento deve ser engolida imediatamente sem mastigar e deve ser seguida de um copo de água para assegurar que você engoliu todo o medicamento.

Depressão Maior

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Transtorno de Ansiedade Generalizada

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Fobia Social

A dose inicial recomendada para **cloridrato de venlafaxina** é de 75mg, administrada uma vez por dia (1x/dia). Não há evidências de que doses maiores proporcionem algum benefício adicional.

Transtorno do Pânico

Recomenda-se que a dose de 37,5mg/dia de **cloridrato de venlafaxina** seja usada por 7 dias. Depois, a dose deve ser aumentada para 75mg/dia. Os pacientes que não respondem à dose inicial de 75mg/dia podem beneficiar-se com o aumento da dose até, no máximo, 225mg/dia.

Descontinuando o uso de cloridrato de venlafaxina

Recomenda-se que **cloridrato de venlafaxina** não seja interrompido bruscamente. A dose deve ser reduzida gradualmente de acordo com as instruções do seu médico. O período necessário para descontinuação gradativa pode depender da dose, da duração do tratamento e de cada paciente individualmente.

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em 25% a 50% nos pacientes com insuficiência renal com taxa de filtração glomerular (TFG) de 10 a 70mL/min.

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em até 50% nos pacientes em hemodiálise.

Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática

A dose diária total de **cloridrato de venlafaxina** deve ser reduzida em até 50% em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. Em alguns pacientes, reduções maiores que 50% podem ser adequadas.

Uso em Crianças

Não há experiência suficiente com o uso de **cloridrato de venlafaxina** em pacientes com menos de 18 anos de idade.

Uso em Idosos

Não há recomendação específica para ajuste da dose do **cloridrato de venlafaxina** de acordo com a idade do paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar **cloridrato de venlafaxina** no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento 2 vezes para compensar doses esquecidas. Se você esquecer uma dose você pode comprometer o resultado do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas estão relacionadas abaixo de acordo com as categorias de frequência:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): insônia, dor de cabeça, tontura, sedação, náusea, boca seca, constipação, hiperidrose (suor excessivo).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): diminuição do apetite, sonhos anormais, nervosismo, diminuição da libido, agitação, anorgasmia (falta de prazer sexual ou orgasmo), acatisia (incapacidade de se manter quieto), tremor, parestesia (dormência e formigamento), disgeusia (alteração do paladar), deficiência visual, distúrbio de acomodação, midríase (pupila dilatada), tinido (zumbido no ouvido), taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos), palpitação, hipertensão (pressão alta), ondas de calor, dispneia (falta de ar), bocejos, diarreia, vômito, erupção cutânea (lesão na pele), prurido (coceira), suor noturno, hipertonia (aumento da contração muscular), hesitação urinária, retenção urinária, polaciúria (aumento da frequência urinária), disfunção erétil, ejaculação anormal, fadiga, astenia (fraqueza), calafrios, perda de peso, aumento de peso.

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): estado de confusão, mania, hipomania, despersonalização, alucinação, orgasmo anormal, bruxismo, apatia (ausência de emoção), síncope (desmaio), mioclonia (espasmos musculares), distúrbio do equilíbrio, coordenação anormal, discinesia (movimentos involuntários, principalmente dos músculos da boca, língua e face, ocorrendo exteriorização da língua e movimentos de

um canto a outro da boca), hipotensão ortostática (diminuição da pressão arterial ao levantar), hipotensão (pressão baixa), sangramento gastrointestinal, teste de função hepática anormal, urticária (alergia de pele), alopecia (perda de cabelo), equimose (manchas arroxeadas), reação de fotossensibilidade (sensibilidade à luz), incontinência urinária (dificuldade em controlar a urina), metrorragia (sangramento vaginal fora do período menstrual), menorragia (sangramento menstrual excessivo ou prolongado), aumento do colesterol no sangue, fratura óssea.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): agranulocitose (ausência de células de defesa: neutrófilos, basófilos e eosinófilos), anemia aplástica (diminuição da produção de glóbulos vermelhos do sangue), pancitopenia (diminuição de todas as células do sangue), neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), reação anafilática, secreção inapropriada do hormônio antidiurético (alteração na secreção do hormônio ADH), hiponatremia (redução da concentração de sódio no sangue), delírio, síndrome neuroléptica maligna (contração muscular grave, febre, aceleração dos batimentos do coração, tremor), síndrome da serotonina (alterações do estado mental, dos movimentos entre outras), convulsão, distonia (contração involuntária da musculatura, lenta e repetitiva), glaucoma de ângulo fechado, *torsade de pointes*, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, eletrocardiograma com prolongamento do intervalo QT, cardiomiopatia do estresse (cardiomiopatia de takotsubo), doença pulmonar intersticial, eosinofilia pulmonar, pancreatite (inflamação no pâncreas), hepatite (inflamação do fígado), Síndrome de Stevens-Johnson (reação alérgica grave), necrólise epidérmica tóxica (descamação grave da camada superior da pele), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, geralmente de origem alérgica), eritema multiforme (manchas vermelhas, bolhas e ulcerações em todo o corpo), rabdomiólise (destruição das células musculares).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): trombocitopenia (diminuição das plaquetas do sangue), prolactina aumentada no sangue, discinesia tardia, hemorragia da mucosa, tempo de sangramento aumentado.

Os seguintes sintomas foram relatados em associação com a repentina interrupção ou redução de dose ou retirada de tratamento: hipomania, ansiedade, agitação, nervosismo, confusão, insônia ou outros distúrbios do sono, fadiga (sensação de cansaço), sonolência, parestesia (formigamento), tontura, convulsão, vertigem, cefaleia (dor de cabeça), sintomas de gripe, tinido, coordenação e equilíbrio prejudicados, tremor, sudorese, boca seca, anorexia, diarreia, náusea e vômito, deficiência visual e hipertensão. Em estudos anteriores à comercialização, a maioria das reações à interrupção foi leve e resolvida sem tratamento. Embora esses eventos sejam geralmente autolimitados, tem havido relatos de sintomas graves de descontinuação e, às vezes, esses efeitos podem ser prolongados e graves.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Recomendam-se medidas gerais de suporte e tratamento sintomático, além de monitorização do ritmo cardíaco e dos sinais vitais. Não se recomenda a indução de vômitos quando houver risco de aspiração. Pode haver indicação para lavagem gástrica caso essa lavagem seja realizada logo após a ingestão ou em pacientes sintomáticos. A administração de carvão ativado também pode limitar a absorção do fármaco. É provável que diurese forçada, diálise, hemoperfusão e ex-sanguíneo transfusão não apresentem benefícios. Não são conhecidos antídotos específicos do **cloridrato de venlafaxina**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

**USO SOB PRESCRIÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITA
VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO**

DIZERES LEGAIS

Registro 1.5423.0250

Registrado e produzido por:

Geolab Indústria Farmacêutica S/A

CNPJ: 03.485.572/0001-04

VP. 1B QD.08-B MÓDULOS 01 A 08 - DAIA - ANÁPOLIS – GO

www.geolab.com.br

Indústria Brasileira

SAC: 0800 701 6080

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 08/08/2024.



Histórico de Alteração para a Bula

Anexo B

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/Notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Número expediente	Assunto	Data do expediente	Número expediente	Assunto	Data da Aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
01/08/2022	4482331/22-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	01/08/2022	4482331/22-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	01/08/2022	Versão Inicial	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300
12/07/2023	0719299/23-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/07/2023	0719299/23-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/07/2023	Forma farmacêutica 3. Quando não devo usar este medicamento? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300
04/08/2023	0818555/23-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	04/08/2023	0818555/23-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	04/08/2023	Correção na descrição da forma farmacêutica	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300

06/11/2024	1531404/24-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2024	1531404/24-3	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/11/2024	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Dizeres legais	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300
10/12/2024	1688052/24-1	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/12/2024	1688052/24-1	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/12/2024	Correção do texto de bula.	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300
08/01/2025	0022275/25-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	0022275/25-8	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	Dizeres Legais	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300

08/01/2025	0024738/25-5	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	0024738/25-5	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Dizeres legais	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300
08/01/2025	---	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	---	10452 GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/01/2025	Correção do texto de bula.	VP	75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300 150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 300