

**LONIUM<sup>®</sup>**

Apsen Farmacêutica S.A.  
Comprimidos Revestidos  
40mg



# LONIUM<sup>®</sup>

brometo de otilônio

## APRESENTAÇÃO

Comprimido revestido de 40 mg. Caixas com 10, 30 e 60 comprimidos

## USO ORAL

## USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

### Cada comprimido revestido de Lonium 40 mg contém:

brometo de otilônio (equivalente a 32 mg de otilônio base) ..... 40 mg

Excipientes qsp ..... 1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, lactose monoidratada, fosfato de cálcio tribásico, croscarmelose sódica, monoestearato de glicerila, amido, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido titânio.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

LONIUM<sup>®</sup>, cujo princípio ativo é o brometo de otilônio, é indicado para o tratamento sintomático da dor, do desconforto, da distensão abdominal e de outros transtornos funcionais do trato gastrointestinal, tal como a Síndrome do Intestino Irritável. Também está indicado no preparo para exames por imagem do trato gastrointestinal.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

LONIUM<sup>®</sup> é um antiespasmódico e por isso é usado no alívio das contrações da musculatura lisa do trato gastrointestinal presentes, por exemplo, na Síndrome do Intestino Irritável. LONIUM<sup>®</sup> é pouco absorvido, por isso permanece no intestino e age localmente.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nos casos de alergia ao brometo de otilônio ou aos componentes da formulação do produto.

**Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O brometo de otilônio deve ser utilizado com cuidado em pacientes com glaucoma, hipertrofia prostática benigna (aumento da próstata comum em homens idosos) e estreitamentos do intestino delgado.



### **Gravidez**

O brometo de otilônio não causou malformações nos fetos de ratos e coelhos. Entretanto, não há estudos adequados e bem controlados sobre a segurança do uso do brometo de otilônio em mulheres grávidas. Como os estudos em animais nem sempre reproduzem a resposta em humanos, não se recomenda a administração de LONIUM® durante a gravidez, exceto sob supervisão médica.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **Amamentação**

O uso durante a amamentação deve ser limitado, porém, se necessário, deve ser realizado sob supervisão médica.

### **Pacientes idosos**

As doses e precauções para pacientes idosos são as mesmas recomendadas para os adultos, devendo haver acompanhamento médico.

### **Interações medicamentosas**

Até o momento, não foram identificados relatos de interações medicamentosas com o brometo de otilônio.

### **Interferência em exames laboratoriais**

Não há relatos de interferência do brometo de otilônio sobre resultados de exames laboratoriais.

### **Atenção:**

**Contém lactose.**

**Contém o corante dióxido de titânio que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

LONIUM® deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**



**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de LONIUM<sup>®</sup> (brometo de otilônio) são circulares, biconvexos, brancos e lisos.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

LONIUM<sup>®</sup> é apresentado na forma de comprimidos revestidos de 40 mg.

O produto é de uso oral.

### **Tratamento Sintomático da Síndrome do intestino Irritável**

A dose recomendada de LONIUM<sup>®</sup> é de 1 comprimido de 40 mg três vezes ao dia, antes do café da manhã, do almoço e do jantar.

### **Preparo prévio a exames (esofagogastroduodenoscopia)**

A dose recomendada de LONIUM<sup>®</sup> é de 1 comprimido de 40 mg na noite anterior ao exame e 1 comprimido de 40 mg na manhã do exame.

### **Pacientes Idosos**

As doses e cuidados para pacientes idosos são as mesmas recomendadas para os adultos, devendo ter o acompanhamento médico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você se esqueça de tomar LONIUM<sup>®</sup> (brometo de otilônio) no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento em dobro para compensar doses esquecidas.



**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Devido a sua baixa absorção sistêmica, o brometo de otilônio apresenta um perfil favorável de eventos adversos.

**Reações incomuns** (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): palpitação, dor de cabeça e tontura, desconforto abdominal, náusea e vômito, retenção urinária, aumento do diâmetro das pupilas sem interferir com a visão.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

A absorção do brometo de otilônio é muito pequena. A maior parte da droga administrada é excretada nas fezes em 48 horas. Estas características do brometo de otilônio fazem com que ele seja um medicamento seguro. Eventos adversos resultantes da administração de doses altas de brometo de otilônio são raros.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais informações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.0118.0593

Responsável Técnico: Rodrigo de Moraes Vaz

CRF-SP nº 39.282

Registrado e produzido por:

APSEN FARMACÊUTICA S/A

Rua La Paz, nº 37/67 - Santo Amaro

CEP 04755-020 - São Paulo - SP

CNPJ 62.462.015/0001-29

Indústria Brasileira

® Marca registrada de Apsen Farmacêutica S.A.



Centro de Atendimento ao Cliente

0800 016 5678

LIGAÇÃO GRATUITA

[infomed@apsen.com.br](mailto:infomed@apsen.com.br)

[www.apsen.com.br](http://www.apsen.com.br)

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 15/01/2025.**

Lonium \_com\_rev\_VP\_v05





### HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DA BULA<sup>1</sup>

| Dados da submissão eletrônica |                      |   | Dados da petição/ Notificação que altera a bula |                      |         |                   | Dados das alterações de bulas  |                               |  |
|-------------------------------|----------------------|---|---|----------------------|---------|-------------------|--|-------------------------------|--|
| Data do expediente            | Número do expediente | Assunto   | Data do expediente                              | Número do expediente | Assunto | Data da aprovação | Itens de bula <sup>2</sup>   | Versões (VP/VPS) <sup>3</sup> | Apresentações relacionadas <sup>4</sup>                                      |
| 15/01/2025                    | -                    | Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | -   | -                    | -       | -                 | 3. Quando não devo usar este medicamento?<br>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?<br><br>DIZERES LEGAIS | VP                            | - 40 mg x 10 comp. rev.<br>- 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev |



|            |              |   |   |   |   |   |   |        |  |
|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------|--|
|            |              |   |   |   |   |   | 4. Contraindicações<br>5. Advertências e precauções<br>DIZERES LEGAIS | VPS    |  |
| 01/06/2023 | 0559159/23-4 | Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | - | - | - | - | DIZERES LEGAIS  | VP/VPS | - 40 mg x 10 comp. rev.<br>- 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev |
| 12/11/2020 | 3973462/20-5 | Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | - | - | - | - | 9. Reações adversas   | VPS    | - 40 mg x 10 comp. rev.<br>- 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev |
| 29/05/2019 | 0479746/19-9 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12                    | - | - | - | - | DIZERES LEGAIS  | VP/VPS | - 40 mg x 10 comp. rev.<br>- 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev |



|            |              |  |            |              |  |            |  |        |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|--|--------|--|
| 31/08/2018 | 0857712/18-9 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12 | -          | -            | -  | -          | Apresentações  | VP/VPS | - 40 mg x 10 comp. rev.<br>- 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev |
| 15/10/2015 | 0912459/15-4 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12 | 15/10/2015 | 0912459/15-4 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12 | 15/10/2015 | 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?    | VP     | - 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev.                           |
|            |              |  |            |              |  |            | 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? |        |  |
| 16/04/2014 | 0290811/14-5 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12 | 16/04/2014 | 0290811/14-5 | Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC nº 60/12 | 16/04/2014 | 5. Advertências e Precauções                           | VPS    | - 40 mg x 30 comp. rev.<br>- 40 mg x 60 comp. rev.                           |
|            |              |  |            |              |  |            | 9. Reações adversas                                    |        |  |

<sup>1</sup> Informar os dados relacionados a cada alteração de bula que acontecer em uma nova linha. Eles podem estar relacionados a uma notificação, a uma petição de alteração de texto de bula ou a uma petição de pós-registro ou renovação. No caso de uma notificação, os Dados da Submissão Eletrônica correspondem aos Dados da petição/notificação que altera bula, pois apenas o procedimento eletrônico passou a ser requerido após a inclusão das bulas no Bulário. Como a empresa não terá o número de expediente antes do peticionamento, deve-se deixar em branco estas informações no Histórico de Alteração de Bula. Mas elas podem ser consultadas na página de resultados do Bulário e deverão ser incluídos na tabela da próxima alteração de bula.



<sup>2</sup> Informar quais Itens de Bula foram alterados, conforme a RDC 47/09 (anexo I da Bula para o Paciente e/ou para o Profissional de Saúde).

<sup>3</sup> Informar se a alteração está relacionada às versões de Bulas para o Paciente (VP) e/ou de Bulas para o Profissional de Saúde (VPS).

<sup>4</sup> Informar quais apresentações, descrevendo as formas farmacêuticas e concentrações que tiverem suas bulas alteradas.