

## I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**simeticona**

### APRESENTAÇÃO:

Emulsão oral de 75 mg/mL. Embalagem contendo 1 frasco de 15 mL.

### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL da emulsão oral contém:

simeticona.....75 mg  
veículo\* q.s.p.....1 mL

\*goma xantana, carmelose sódica + celulose microcristalina, corante vermelho allura 129, sacarina sódica, ciclamato de sódio, propilenoglicol, propilparabeno, metilparabeno, essência de morango, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, ácido cítrico, água de purificada.

## II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### INDICAÇÃO

Alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

### MODO DE USAR

#### Uso pediátrico

**Crianças com até 2 anos:** tomar até 6 gotas por dose. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 67 gotas por dia.

**Crianças de 2 a 12 anos:** tomar no mínimo 6 gotas e no máximo 11 gotas. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 67 gotas por dia.

#### Uso adulto

**ADULTOS:** Tomar no mínimo 15 gotas e no máximo 46 gotas por dose. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 186 gotas por dia.

Uso para preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia: modo de uso conforme indicação médica.

Agite antes de usar.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### ADVERTÊNCIA

**Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.**

**Contraindicações:** Distensão abdominal grave; cólica grave; dor persistente (mais que 36 horas); massa palpável na região do abdômen; alergia a simeticona e a seus derivados; perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

**Efeitos adversos:** diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Atenção: Contém o corante vermelho allura 129 que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.**

### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto do medicamento:** emulsão homogênea, de cor rosa intenso, com odor e sabor de morango, isenta de impurezas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **III) DIZERES LEGAIS**

#### **MEDICAMENTO NOTIFICADO**

Notificado por: **MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08

Bairro Chácara Assay

CEP 13.186-901 – Hortolândia/SP

CNPJ 92.265.552/0009-05

Indústria Brasileira

Produzido por: **EMS S/A.**

Hortolândia/SP

SAC 0800 - 600 06 60

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**



