

**SUVERSADEX<sup>®</sup>**  
sugamadex sódico

**Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda.**

**Solução Injetável**

**100 mg/ mL**

**Bula Paciente**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

**SUVERSADEX<sup>®</sup>**  
**sugamadex sódico**  
Solução Injetável  
100 mg/ mL

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

### APRESENTAÇÃO

Solução injetável de 100 mg/ mL em embalagem com 10 frascos-ampola contendo 2 mL (200 mg) de solução.

### USO INTRAVENOSO

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE

### COMPOSIÇÃO

#### SUVERSADEX<sup>®</sup> 100 mg/ mL

Cada frasco-ampola de 2 mL contém 217,6 mg de sugamadex sódico equivalente a 200 mg sugamadex.

Excipientes: ácido clorídrico, hidróxido de sódio (para ajuste do pH), água para injetáveis e nitrogênio.

O pH da solução situa-se entre 7 e 8 e a osmolaridade entre 300 e 500 mOsm/kg.

Cada mL contém 9,4 mg de sódio.

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O **SUVERSADEX<sup>®</sup>** (sugamadex sódico) é usado para acelerar a recuperação de seus músculos dos efeitos dos relaxantes musculares após uma cirurgia, quando o relaxante muscular utilizado for o brometo de rocurônio ou o brometo de vecurônio.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O **SUVERSADEX<sup>®</sup>** é um medicamento de um grupo chamado Agentes Reversores do Bloqueio Neuromuscular de Ligação Seletiva.

Quando você é submetido a determinados tipos de cirurgia, os seus músculos precisam estar completamente relaxados. Isso facilita o procedimento para o cirurgião. Os medicamentos usados para essa finalidade são chamados relaxantes musculares, e entre eles estão o brometo de rocurônio e o brometo de vecurônio. Uma vez que esses medicamentos também proporcionam o relaxamento dos músculos respiratórios, você precisa de ajuda para respirar (ventilação artificial) durante e depois da cirurgia, até que possa respirar sozinho novamente.

O **SUVERSADEX<sup>®</sup>** é usado para eliminar os efeitos dos relaxantes musculares usados em anestésias. O produto apresenta essa ação porque a substância sugamadex combina-se ao brometo de rocurônio ou ao brometo de vecurônio no seu organismo. sugamadex sódico é administrado para acelerar a sua recuperação em relação aos efeitos dos relaxantes musculares; por exemplo, ao final da cirurgia ele é administrado para permitir que você respire sozinho, normalmente, mais precocemente.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento é contraindicado para uso por pessoas que apresentam alergia (hipersensibilidade) a s sugamadex sódico ou quaisquer dos componentes da fórmula do produto.**

**Informe o seu anestesiológista se algum desses casos se aplica a você.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Seu anestesiológista precisa ser informado antes da administração deste medicamento se você:

- Apresenta ou apresentou alguma doença dos rins. Isso é importante porque sugamadex sódico é eliminado do seu organismo através dos rins.
- Apresenta doenças que, conhecidamente, podem proporcionar um aumento do risco de sangramentos (distúrbios da coagulação do sangue).
- Apresenta ou apresentou alguma doença no fígado.

- Apresenta retenção de fluído (edema).

**Informe o seu anestesiológista se algum desses casos se aplica a você.**

### **Crianças e adolescentes**

Este medicamento não é indicado para crianças com menos de 2 anos de idade.

### **Interações medicamentosas**

**Informe o seu anestesiológista se você está fazendo uso de algum outro medicamento** ou se tomou outros medicamentos recentemente. Informe também sobre medicamentos e produtos fitoterápicos utilizados que tenham sido comprados sem receita médica. O sugamadex sódico pode afetar ou ser afetado por outros medicamentos.

### **Alguns medicamentos reduzem o efeito de sugamadex sódico**

**É importante que você informe o seu anestesiológista se você tomou recentemente:**

- Toremifeno (usado para o tratamento do câncer de mama).
- Ácido fusídico (antibiótico).

### **O SUVERSADEX® pode afetar os anticoncepcionais hormonais**

O sugamadex sódico pode diminuir os efeitos dos anticoncepcionais hormonais, incluindo as pílulas, os anéis vaginais, os implantes ou o sistema hormonal intrauterino porque reduz a quantidade do hormônio progestagênio absorvida pela mulher. A quantidade perdida de progestagênio com a utilização de SUVERSADEX® é mais ou menos a mesma de uma pílula “esquecida”.

- Se você estiver tomando a **pílula** no dia em que receber SUVERSADEX®, siga as instruções para “esquecimento” contidas na bula do seu anticoncepcional.
- Se você estiver usando **outros** métodos anticoncepcionais (por exemplo, anel vaginal, implante ou sistema intrauterino), você deve usar um método anticoncepcional não hormonal adicional, por exemplo, a camisinha, durante os 7 dias seguintes.

### **Efeitos sobre exames laboratoriais**

De modo geral, SUVERSADEX® não interfere nos exames laboratoriais. Entretanto, ele pode afetar os resultados de um exame para um hormônio chamado progesterona.

### **Gravidez e lactação**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano: O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe o seu anestesiológista se você estiver grávida, suspeitar que possa estar ou se estiver amamentando.** Você ainda poderá receber sugamadex sódico, mas primeiro deverá discutir isso com o seu médico.

### **Efeitos sobre a habilidade de dirigir e operar máquinas**

O seu médico lhe dirá quando é seguro dirigir ou operar máquinas depois de ter recebido SUVERSADEX®. Até onde se sabe, sugamadex sódico não é conhecido por apresentar qualquer efeito sobre o estado de alerta e concentração.

### **SUVERSADEX® contém sódio**

Informe o seu anestesiológista se você segue uma dieta controlada de sal.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

O hospital manterá o medicamento SUVERSADEX® nas condições corretas em que ele deve ser armazenado. Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz. Não congelar.

**Após aberto, deve ser utilizado imediatamente.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

SUVERSADEX® é uma solução para injeção límpida, incolor a levemente amarelada livre de partículas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Dose:**

O seu anestesiolegista saberá como calcular a dose de SUVERSADEX® que você precisa com base:

- No seu peso;
- Na quantidade de relaxante muscular que ainda está lhe afetando.

A dose usual é de 2 a 4 mg/kg do peso corporal para pacientes acima de 2 anos de idade. A dose de 16 mg/kg pode ser administrada em adultos se uma recuperação imediata do relaxamento muscular for necessária.

### **Modo de usar:**

SUVERSADEX® será administrado pelo seu anestesiolegista, em injeção única através de um acesso intravenoso.

É recomendado o uso da agulha de calibre 21 para reconstituição do frasco para diluição.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se SUVERSADEX® não for administrado, seus músculos voltarão ao estado anterior à cirurgia assim que você recuperar sua força. Isso pode demorar mais tempo comparado a quando SUVERSADEX® for administrado.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Assim como qualquer medicamento, sugamadex sódico pode causar efeitos colaterais, mas nem todos os pacientes os apresentam.

Caso esses efeitos ocorram enquanto você estiver anestesiado, eles serão percebidos e tratados apropriadamente pelo seu anestesiolegista.

### **Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento):**

- Tosse.
- Problemas nas vias aéreas, que podem incluir tosse ou movimento como se estivesse acordando ou tomando fôlego.
- Anestesia leve – nesse caso você pode começar a acordar antes do tempo desejado e pode precisar de mais anestésico. Com isso, você pode se mexer ou tossir ao final da cirurgia.
- Complicações durante o procedimento como alteração na frequência cardíaca, tosse ou movimento.
- Diminuição da pressão sanguínea devido à cirurgia.

### **Incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento):**

- Reações alérgicas – tais como erupção ou vermelhidão na pele, inchaço da sua língua e/ou garganta, encurtamento da respiração, alterações da pressão sanguínea ou da frequência cardíaca, algumas vezes resultando em uma importante diminuição da pressão sanguínea.
- Reações alérgicas graves ou reações do tipo alérgico que podem ser uma ameaça à vida.
- As reações alérgicas foram relatadas mais comumente em voluntários sadios e conscientes.
- Respiração curta devido a contrações dos músculos das vias respiratórias (broncoespasmo), ocorrida em pacientes com histórico de problemas nos pulmões.
- Retorno do relaxamento muscular após a cirurgia.

### **Frequência desconhecida:**

- Diminuição importante dos batimentos cardíacos e desaceleração do coração até parada cardíaca podem ocorrer quando sugamadex sódico é administrado.

**Se após a cirurgia você perceber que algum efeito colateral se tornou grave, ou se você notar algum efeito colateral que não seja mencionado nesta bula, informe o seu anestesiológico ou outro médico.**

**Atenção: este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe o seu médico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Uma vez que o seu anestesiológico monitorará suas condições rigorosamente, dificilmente ele injetará o medicamento em superdose, mas caso isso aconteça inadvertidamente, é improvável que cause algum problema.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III - DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.5143. 0064

**Produzido por:**

Dr. Reddy's Laboratories Ltd.  
FTO Unit IX, Visakhapatnam, Índia.

**Importado por:**

Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda.  
Aparecida de Goiânia - Brasil  
CNPJ 03.978.166/0007-60

**Registrado por:**

Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda.  
Av. Guido Caloi, 1985 - Galpão 11  
Jd. São Luís – São Paulo – SP  
CEP: 05802-140  
CNPJ nº 03.978.166/0001-75

**SAC**  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
**0800 87 89 055**  
carebrasil@drreddys.com



**VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 26/09/2024.**

SG\_1124/BL-02PC

**Histórico de alteração para a bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da Petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versão (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/12/2024	Versão Atual	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	10/12/2024	Versão Atual	10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	10/12/2024	4. O que devo saber antes de usar o medicamento?  5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?  - Dizeres legais	VP	100 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10 FA VD TRANS X 2 ML
							7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO  5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  - Dizeres legais	VPS	
03/05/2022	2668497/22-1	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula	03/05/2022	2668497/22-1	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - publicação no	03/05/2022	Submissão eletrônica para disponibilização do texto de bula no Bulário	VP/VPS	100 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10 FA VD TRANS X 2 ML

		- publicação no Bulário RDC 60/12			Bulário RDC 60/12		eletrônico da ANVISA		
--	--	---	--	--	-------------------	--	----------------------	--	--